

Jouw gids over

gelTM



**De eerste hapjes met
een opvolgpreparaat**


VitafloTM




Hoe bereid je gel?

Gel kan worden ingenomen als gel of als drank.


Als gel



Giet de inhoud van een sachet in de schudbeker.



Voeg 30ml koud water toe. Sluit de schudbeker en schud krachtig gedurende 10 seconden.




Laat 2 minuten rusten; er vormt zich een zacht papje. Bied aan met een lepeltje.


Als drank



Leeg de inhoud van het zakje in de schudbeker.



Voeg ongeveer 80ml (halverwege de schudbeker) koud water toe. Sluit het deksel en goed schudden gedurende 10 seconden.




Onmiddellijk opdrinken.

Belangrijke informatie

- Mag alleen worden gebruikt onder strikt medisch toezicht.
- Niet-gearomatiseerde **gel** is geschikt vanaf 6 maanden tot 10 jaar.
- Gearomatiseerde **gel** is geschikt van 1 tot 10 jaar.
- De voeding moet worden aangevuld met natuurlijke eiwitten, water en andere voedingsstoffen in voorgeschreven hoeveelheden om te voorzien in de vocht- en algemene voedingsbehoeften.
- Niet geschikt als enige voedingsbron.
- Niet geschikt voor parenteraal gebruik.

Bewaring

- Bewaren in een koele, droge omgeving.
- De zakjes bevatten een individuele dosis.
- Ongebruikt poeder in een zakje dient goed gesloten bewaard te worden in de koelkast en opgebruikt binnen de 24 uur.



Praktische tips om te starten met gel

- Bied **gel** de eerste keer aan als je kindje honger heeft. Dat verkleint de kans dat hij/zij de voeding weigert.
- Bied je kindje water aan na elke lepel **gel**.
- Vermijd starten met **gel** als je kindje moe of ziek is.
- Bereid **gel** telkens op dezelfde consistentie en temperatuur. Als je kindje tandjes krijgt, bied **gel** dan aan met kouder water.
- Als je baby weigert **gel** in te nemen, probeer het dan een paar dagen later opnieuw.
- Plan de maaltijden op vaste tijdstippen in en vermijd te lange maaltijden (20 tot 30 minuten per maaltijd).
- Introduceer **gel** met een lepel. Op latere leeftijd kunnen kinderen ervoor kiezen **gel** uit een beker te drinken, als ze dat willen.

Veelgestelde vragen



Wat is het eiwit equivalent (PE) gehalte van gel?

Elk zakje van 24 gram bevat 10 gram PE.

Kan gel gearomatiseerd worden?

Een Flavourpac™ kan worden toegevoegd aan niet-gearomatiseerde gel (aanbevolen hoeveelheid is ½ van een Flavourpac zakje per zakje gel). Flavourpac is geschikt vanaf 3 jaar.

Kan gel worden gemaakt met een andere vloeistof dan water?

Vitaflo raadt aan om gel aan te maken met water. Gel kan echter ook met ProZero® worden aangemaakt als er extra calorieën nodig zijn of als een kind moeite heeft met het consumeren van gel die met water is aangemaakt.

Moet gel onmiddellijk na het bereiden worden geconsumeerd?

Gel moet na de bereiding volgens de bereidingswijze worden geconsumeerd. Vanwege het zetmeel dat in de gel wordt gebruikt, zal de gel, als hij langer dan 2 minuten blijft staan, verder indikken.





De producten van het gel-gamma zijn voeding voor medisch gebruik. PKU gel is dieetvoeding bij fenyylketonurie (PKU). HCU gel is dieetvoeding bij homocystinurie (HCU). MSUD gel is dieetvoeding bij maple urine disease (MSUD). TYR gel is dieetvoeding bij Tyrosinemie (TYR). MMA/PA gel is dieetvoeding bij methylmalonzuuracidemie en propionzuuracidemie (MMA/PA). GA gel is dieetvoeding bij glutaaracidurie type 1 (GA). Niet-gearomatiseerde gel is geschikt vanaf 6 maanden tot 10 jaar. Gearomatiseerde PKU gel is geschikt vanaf 1 jaar tot 10 jaar. De genoemde producten zijn niet geschikt als enige voedingsbron. Alle producten moeten onder medisch toezicht worden gebruikt en zijn niet geschikt voor parenteraal gebruik. PKU gel sinaasappelsmaak bevat soja.

Flavourpac is voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij aangeboren metabole aandoeningen. Flavourpac is geschikt vanaf 3 jaar. Dient onder medisch toezicht worden gebruikt. Flavourpac is niet geschikt als enige voedingsbron en is niet geschikt voor parenteraal gebruik.

ProZero is voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij aangeboren eiwitstofwisselingsziekten en nieraandoeningen geschikt vanaf de leeftijd van zes maanden. ProZero dient enkel te worden gebruikt onder medisch toezicht, is niet geschikt als enige voedingsbron en is niet geschikt voor parentaal gebruik. Raadpleeg het productetiket voor allergenen- en andere productinformatie. ProZero bevat melk.

Raadpleeg de etiketten voor allergenen en andere productinformatie.

Vitaflor France 38 Rue de Berri, 75008 Paris

E-mail: vitaflor-benelux@vitafloweb.com

Nederland: www.vitafriendspku.nl

België: www.vitafriendspku.be/nl





Enhancing Lives Together

A Nestlé Health Science Company

Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.

©2023 All rights reserved. Société des Produits Nestlé S.A



April 2023